

sterpazzolina di Moltoni *Sylvia subalpina* | sterpazzolina occidentale *S. iberiae* | sterpazzolina comune o orientale *S. c. cantillans* e *S. c. albistriata*

	colore parti inferiori*	mustacchio	ali	call	canto	altro	areale nidificazione^
<i>subalpina</i>	rosa salmone (tonalità variabile), generalmente esteso su gran parte delle parti inferiori; niente tinte arancioni	abbastanza stretto o corto, spesso poco definito	proiezione primarie generalmente corta, punta arrotondata. Penne più fresche delle altre specie in primavera	trrrr trrrr tipo scricciolo	più veloce e “arrabbiato” delle altre, a tratti ricorda il verzellino, finisce bruscamente	muta complessa, generalmente penne ‘fresche’ anche in primavera; arriva di solito un po’ dopo le altre. Poco bianco su punte timoniere	Piemonte e Lombardia meridionali, Liguria, Emilia R., Toscana, Sardegna, Corsica, Baleari. Marginalmente in Umbria, Marche; coppie sparse in Campania, Lazio?
<i>iberiae</i>	arancione-rossastro (più arancione puro con tinta gialla verso ovest, in N Africa), esteso fino al basso ventre	sottile ma molto ben demarcato	proiezione delle primarie corta, ma ala “appuntita”	tchek tipo bigiarella ma poco più dolce; più duro di <i>cantillans</i>	variato, anche nel tono, su e giù un po’ come un fanello, lungo, spesso finisce con note ben definite	femmine più arancione-giallastre inferiormente nel SW dell’areale. Poco bianco su punte timoniere	Liguria e Piemonte occidentali, prob. Val d’Aosta, Francia, Spagna, Nord Africa
<i>cantillans</i>	parti inferiori da rosso-arancione a rosso-mattone, colorazione spesso più marcata sul petto e ventre bianco, ma a volte più esteso. Fianchi talvolta con colore più slavato	molto largo ed esteso	lunghe, proiezione lunga	check tipo bigiarella ma più dolce, ‘soffice’, ‘bagnato’ (solitamente più di <i>iberiae</i>)	un po’ più simil-capinera rispetto alle altre specie, tono un po’ più dolce, spesso con note conclusive distinte	spesso parecchio bianco su punta timoniere (adulti)	da Umbria e Marche fino alla Sicilia. Coppie sparse anche in Toscana, Emilia R., Lombardia, Piemonte sud-orientale, Trentino, Veneto
<i>albistriata</i>	simile a <i>cantillans</i> ma più estrema: rosso-mattone anche molto scuro, perlopiù limitato al petto, fianchi con colore slavato e ventre bianco	molto largo ed esteso	lunghe, proiezione lunga	tret, spesso ripetuto; anche note singole simili a <i>cantillans</i> o <i>iberiae</i> , di solito miste a tret	canto un po’ più aspro e un po’ più simil-canapino, spesso con ripetizioni	generalmente più grande, becco a volte più lungo e ‘ricurvo’. Maschi: strie loral scure, parti superiori grigio più puro. Femmine: aspetto più bianco e grigio. Parecchio bianco su punta timoniere (adulti)	dal Triestino alla Turchia. Coppie o individui sparsi regolari in S Italia (sopr. Basilicata e Puglia), talvolta anche in Appennino settentrionale

* relativo ai maschi. Le femmine più anziane possono assumere una colorazione che tende a quella dei maschi della propria specie / sottospecie

^ soprattutto negli ultimi anni, si sono rilevati diversi tentativi di nidificazione di diversi taxa anche extra-areale ed è probabile che a causa dell’espansione, favorita dal clima più caldo, tali casi diventeranno sempre più frequenti (aumenta anche possibilità di ibridi)

ricordarsi che si tratta di caratteri “di massima”!